

የ BCG ክትባት እና የ TB ምርመራዎች

የ TB ምርመራ ከፈለጉ በልጅነት ጊዜ የ BCG ክትባት እንደወሰዱ ማወቅ አስፈላጊ ነው። በተለይም አሁን አዋቂ ከሆኑ፣ ምንም እንኳን ክትባት የወሰዱ ቢሆንም አሁንም በ TB ሊያዙ ይችላሉ።



የ BCG ክትባት ከክፉ የልጅነት TB ዓይነቶች ይከላከላል። ትልቅ ሰው ከሆኑ አይከላከልሉም።



የ TB በሽታን በደም ምርመራ ይፈትሹ። BCG ተብሎ የሚጠራው የ TB ክትባት የደም ምርመራን ውጤት አይለውጥም። በልጅነት ጊዜ የ BCG ክትባት ከወሰዱ ለሐኪምዎ የ TB የቆዳ ምርመራ እንዳይጠቀሙ ይናገሩ።



የደረት ኤክስሬይ እና ዶክተሮች የ TB የደም ምርመራዎ አዎንታዊ ከሆነ የሚቀጥለው እርምጃ ነው። ንቁ ያልሆነ TB ወይም ንቁ የቲቢ በሽታ እንዳለብዎት ሐኪምዎ ይወስናል።



በ U.S. ውስጥ፣ ብዙ ሰዎች በጋላ ላይ እንዳይታመሙ እንዲረዳቸው ንቁ ያልሆነ የ TB መድሃኒት ይወስዳሉ። ሌሎች አገሮች ንቁ ላልሆነ የ TB በሽታ መድኃኒት ላይሰጡ ይችላሉ። መድሃኒት ብዙ ጊዜ ከ 3 እስከ 4 ወራት ይቆያል።

ንቁ የሆነ የ TB በሽታ ያለባቸው ሰዎች ህመም ይሰማቸዋል እናም የ TB ጀርሞችን ወደ እነሱ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ። በ206-744-4579 ሊደውሉልን፣ በአማራጭ 1፣ ወይም ኢሜይል ሊያደርጉልን ይችላሉ። ጥያቄዎችን ለመጠየቅ LTBI@kingcounty.gov ይጠቀሙ።