

لقاح BCG واختبارات السل

إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار السل، فمن الضروري أن تكون على علم إذا كنت قد تلقيت لقاح BCG عندما كنت طفلاً. لا يزال بإمكانك الإصابة بالسل حتى إذا كنت قد حصلت على اللقاح، لا سيما إذا كنت بالغاً الآن.

يحمي لقاح BCG من أسوأ أنواع الإصابة بالسل في مرحلة الطفولة. ولكنه لا يحميك عندما تكون بالغاً.



قم بإجراء اختبار السل من خلال اختبار دم. لا يُغيّر لقاح السل، المسمى أيضًا باسم BCG، نتيجة اختبار الدم. إذا كنت قد حصلت على لقاح BCG عندما كنت طفلاً، فأخبر الطبيب المعني بك بعدم استخدام اختبار السل عن طريق الجلد.



يكون إجراء أشعة سينية على الصدر وزيارة للطبيب هما الخطوة التالية إذا كانت نتيجة اختبار السل في الدم لديك إيجابية. سيحدّد الطبيب المعني بك ما إذا كنت مصاباً بمرض السل بشكل غير نشط أو نشط.



في الولايات المتحدة، يتناول الكثير من الأشخاص أدوية لمرض السل غير النشط لمساعدتهم في عدم المرض لاحقاً. ربما لا تمنح دول أخرى أدوية لمرض السل غير النشط. يستمر تناول الأدوية لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.



يشعر الأشخاص المصابون بالسل النشط بالمرض ويمكنهم نشر جراثيم مرض السل إلى هؤلاء الذين بالقرب منهم. يمكنك الاتصال بنا على الرقم 206-744-4579، واختيار الخيار رقم 1، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على: LTBI@kingcounty.gov لطرح الأسئلة.