

Vaccin BCG et tests de dépistage de la tuberculose



Si vous avez besoin d'un **test de dépistage de la tuberculose**, il est important de savoir si vous avez reçu le vaccin BCG dans l'enfance. Vous pouvez contracter la tuberculose même si vous avez été vacciné, surtout si vous êtes désormais adulte.



Le vaccin BCG vous protège contre les pires formes de tuberculose infantile. Il ne vous protège pas à l'âge adulte.



Faites un test de dépistage (analyse de sang). Le vaccin contre la tuberculose, également appelé BCG, ne modifie pas le résultat d'une analyse de sang. Si vous avez reçu le vaccin BCG dans l'enfance, demandez à votre médecin de NE PAS réaliser un test cutané de dépistage de la tuberculose.



Consulter un médecin et passer une radiographie des poumons est la prochaine étape dans votre parcours en cas de résultat positif au test de dépistage de la tuberculose (analyse de sang). Votre médecin déterminera si vous présentez une tuberculose inactive ou une tuberculose active.



Aux États-Unis, beaucoup de gens prennent des médicaments contre la tuberculose inactive pour éviter de tomber malade ultérieurement. Dans d'autres pays, la tuberculose inactive ne donne pas lieu à la prescription d'un traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux dure généralement 3 à 4 mois.

Les personnes atteintes de tuberculose active se sentent malades et peuvent transmettre les microbes de la tuberculose à leurs proches. Vous pouvez nous appeler au 206-744-4579, option 1, ou nous envoyer un e-mail : LTBI@kingcounty.gov pour toute question.