

Chanjo ya BCG na Vipimo vya Ugonjwa wa Kifua Kikuu (TB)

Ikiwa unahitaji kipimo cha TB ni muhimu kujua kama ulipokea chanjo ya BCG ukiwa mtoto. Bado unaweza kuambukizwa TB hata kama ulichanjwa, hasa kama wewe sasa ni mtu mzima.



Chanjo ya BCG hulinda dhidi ya aina mbaya zaidi za TB ya utotoni. Haikulindi ukiwa mtu mzima.



Jipime TB kwa kutumia kipimo cha damu. Chanjo ya TB, pia inaitwa BCG, haibadilishi matokeo ya kipimo cha damu. Ikiwa ulikuwa na chanjo ya BCG ukiwa mtoto mwambie daktari wako ASITUMIE kipimo cha ngozi cha TB.



Eksirei ya kifua na kutembelea madaktari ni hatua inayofuata ikiwa kipimo chako cha damu cha TB kinaonyesha umeambukizwa. Daktari wako ataamua ikiwa una ugonjwa wa TB ambao ni amilifu au ugonjwa wa TB ambao si amilifu.



Nchini Marekani, watu wengi hutumia dawa kwa ajili ya TB isiyo amilifu ili kuwasaidia wasiugue baadaye. Nchi nyingine haziwezi kupeana dawa kwa TB isiyo amilifu. Dawa kawaida hukaa kwa miezi 3 hadi 4.

Watu walio na ugonjwa wa TB huhisi wagonjwa na wanaweza kueneza viini vya TB kwa wale walio karibu nao. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia 206-744-4579, chaguo la 1, au baruapepe: LTBI@kingcounty.gov ili kuuliza maswali.